

**<Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado XIBOL 1% emulsión cutánea, para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.

**En este prospecto se explica:**

1. Qué es **XIBOL 1% emulsión cutánea** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **XIBOL 1% emulsión cutánea**.
3. Cómo usar **XIBOL 1% emulsión cutánea**.
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **XIBOL 1% emulsión cutánea**

**XIBOL 1% EMULSIÓN CUTÁNEA**

(*Diclofenaco sódico*)

- Cada 100 ml de emulsión contienen 1g de diclofenaco sódico como principio activo.
- Los demás componentes (excipientes) son dietilenglicol monoetil éter, macroglicéridos de caprilocaproilo, oleato de poliglicerol, isoestearato de isoestearilo, ácido oleico y agua purificada.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.  
Gran Capitán, 10  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

**1. QUÉ ES XIBOL 1% EMULSIÓN CUTÁNEA Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Se presenta en forma de emulsión cutánea. Cada frasco contiene 60 ml.

Este medicamento actúa como analgésico y antiinflamatorio local.

Está indicado para aliviar localmente el dolor e inflamación leves y ocasionales producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves, producidos como consecuencia de una torcedura.

**2. ANTES DE USAR XIBOL 1% EMULSIÓN CUTÁNEA**

**No use XIBOL 1% si:**

- Es usted alérgico al *diclofenaco* o a cualquiera de los componentes del medicamento.
- Tiene una quemadura solar en la zona afectada.
- Ha sufrido reacciones alérgicas (rinitis, dificultad para respirar o asma, urticaria, prurito u otras) causadas por ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroidícos.

**Tenga especial cuidado con XIBOL 1% ya que:**

- No debe utilizarse sobre mucosas, ni sobre piel con heridas o eccemas
- Si es asmático o **alérgico a algún colorante utilizado en alimentación o medicamentos (como por ejemplo : amarillo anaranjado tartrazina, etc.)** deberá consultar con su médico

- antes de tomar este medicamento.
- Debe evitar el contacto con los ojos.
- No debe exponer al sol la zona tratada, ni utilizar con vendajes, ni en zonas extensas.
- No debe aplicar simultáneamente XIBOL 1% en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### **Lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### **Uso en niños**

No utilizar este medicamento en niños menores de 12 años.

### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta médica.

### **Conducción y uso de máquinas:**

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas.

## **3. CÓMO USAR XIBOL 1% EMULSIÓN CUTÁNEA**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

**XIBOL 1%** es un medicamento de uso cutáneo exclusivamente externo (sobre la piel).

Adultos y mayores de 12 años: aplicar una fina capa del producto en la zona dolorida de 3 a 4 veces al día y realice un ligero masaje para facilitar la penetración.

Aplique sobre la zona afectada extendiendo la emulsión mediante desplazamiento del roll-on sobre la piel y fricione con suavidad ejerciendo un ligero masaje para favorecer su absorción.

Lávese las manos después de cada aplicación.

No utilizar más de 7 días seguidos

Si estima que la acción de XIBOL 1% emulsión cutánea es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

### **Si usted usa más XIBOL 1% del que debiera:**

Debido a su uso externo, no es probable que se produzcan caso de intoxicación. En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente a un centro médico o bien llame al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono: 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida **ya que se pueden producir: náuseas, vómitos, dolor abdominal y disminución del nivel de conciencia.**

### **Si olvidó aplicarse XIBOL 1% :**

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Con todos los medicamentos, XIBOL 1% puede tener efectos adversos.

- Poco frecuentes (en más de 1 de cada 1000 pacientes y en menos de 1 de cada 100 pacientes): enrojecimiento, picor y sensación de quemazón cutánea en la zona de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.
- Raros (en más de 1 de cada 10000 pacientes y en menos de 1 de cada 1000 pacientes): dermatitis (inflamación de la piel) producida por el sol.

Si observa estos o cualquier otro efecto adverso no descrito en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE XIBOL 1% EMULSIÓN CUTÁNEA**

**Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.**

No requiere condiciones especiales de conservación

#### **Caducidad**

No usar una vez superada la fecha de caducidad que figura en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales o a la basura.

Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

*Este prospecto ha sido aprobado en Noviembre 2005*