

## PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

### ECHINACIN MADAUS solución oral

*Echinacea purpurea*

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. no obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o si persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### Contenido del prospecto:

1. Qué es ECHINACIN MADAUS y para qué se utiliza
2. Antes de tomar ECHINACIN MADAUS
3. Cómo tomar ECHINACIN MADAUS
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ECHINACIN MADAUS
6. Información adicional

#### 1. Qué es ECHINACIN MADAUS y para qué se utiliza

Es una solución oral del jugo fresco de las partes aéreas floridas de la planta *Echinacea purpurea*. Se presenta en un envase conteniendo 50 ml de solución para administración por vía oral y lleva incorporado un vaso dosificador.

ECHINACIN MADAUS solución oral actúa favoreciendo las defensas inespecíficas del organismo.

ECHINACIN MADAUS solución oral se utiliza para el tratamiento complementario del resfriado común e irritación de las vías respiratorias altas.

#### 2. ANTES DE TOMAR ECHINACIN MADAUS

##### **No tome ECHINACIN MADAUS**

- Si es alérgico (hipersensible) al jugo de *Echinacea purpurea* o a cualquiera de los demás componentes de Echinacin Madaus.
- Si ha presentado reacciones alérgicas conocidas a las flores de la familia de las Astéridas o Compuestas, a la que pertenece la *Echinacea purpurea*.
- Si padece tuberculosis
- Si padece leucemia
- Si presenta enfermedades sistémicas progresivas como colagenosis y esclerosis múltiple.
- Si padece el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades del sistema inmunitario.
- Si tiene menos de 12 años

## **Tenga especial cuidado con ECHINACIN MADAUS**

Si durante el tratamiento con ECHINACIN MADAUS solución oral, los síntomas empeoran o se produce fiebre alta, se debe consultar a un médico o farmacéutico.

Hay un posible riesgo de reacción anafiláctica en pacientes atópicos. Los pacientes atópicos deben consultar a un médico antes de utilizar productos a base de echinacea .

Si usted necesita iniciar un nuevo tratamiento, debe dejar unos días de descanso entre ambos. No debe administrarse durante un periodo de tiempo superior a 8 semanas.

Si los síntomas empeoran o si persisten después de 7 días, debe consultar al médico.

En caso de fiebre, dificultad respiratoria y dolor persistente o de origen desconocido, consulte a su médico.

### **Uso de otros medicamentos**

No se conocen interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

### **Toma de ECHINACIN MADAUS con los alimentos y bebidas:**

ECHINACIN MADAUS se puede tomar en horas diferentes a las comidas.

### ***Embarazo y lactancia***

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Como precaución especial y debido a que no se dispone de datos sobre su utilización durante el embarazo ni lactancia, no se recomienda su uso en dichas situaciones.

### ***Conducción y uso de máquinas***

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

### ***Información importante sobre algunos de los componentes de ECHINACIN MADAUS***

Este medicamento contiene 22% v/v de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 452,5 mg por dosis (2,5 ml), lo que equivale a 10 ml de cerveza ó 5 ml de vino.

Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo.

El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

## **3. Cómo tomar ECHINACIN MADAUS**

Siga exactamente las instrucciones de administración de ECHINACIN MADAUS indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Recuerde tomar su medicamento.

La dosis normal es:

*Adultos, ancianos y adolescentes de 12 años y mayores:*

El tratamiento durante el primer día es de una toma inicial de 2,5 ml, seguida de tomas de 1,5 ml en intervalos de 1 ó 2 horas, hasta un máximo de 15 ml. Los siguientes días se administrarán 2,5 ml 3 veces al día.

No administrar a niños menores de 12 años.

La duración recomendada del tratamiento es de 7 a 15 días.

Diluir el preparado en un poco de agua antes de tomarlo.

Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

***Si usted toma más ECHINACIN MADAUS del que debiera:***

Debido a su contenido en etanol, en caso de ingestión masiva, pueden presentarse síntomas de intoxicación etílica.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

***Si olvidó tomar ECHINACIN MADAUS***

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, ECHINACIN MADAUS puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran.

Con una frecuencia no conocida pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad con sus síntomas típicos como erupción cutánea y/o picor, también se ha observado hinchazón de la cara (edema facial), dificultad respiratoria, vértigo, hipotensión, náusea, vómitos y dolor abdominal..

**Comunicación de efectos adversos:**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

**5. Conservación de ECHINACIN MADAUS**

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar el envase en el embalaje exterior.

Mantener el envase perfectamente cerrado.

***Caducidad***

No utilice ECHINACIN MADAUS después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

**6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Composición de ECHINACIN MADAUS**

- El principio activo es jugo fresco de las partes floridas de *Echinacea purpurea* 800 mg.

- Los demás componentes son: etanol 22% v/v y agua purificada.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Este medicamento es una solución de color marrón claro. Se presenta en un envase conteniendo 50 ml de solución para administración por vía oral y lleva incorporado un vaso dosificador.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación****Titular**

Meda Pharma SL  
C/General Aranzaz, 86  
28027 Madrid  
España

**Responsable de la fabricación**

MADAUS GmbH  
51101 Colonia (Alemania)

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Mylan Pharmaceuticals, S.L.  
C/ Plom, 2-4, 5ª planta  
08038 – Barcelona  
España

**Este prospecto ha sido aprobado en: Noviembre 2017**