

Prospecto: información para el paciente  
**REMIFEMIN<sup>®</sup> comprimidos**  
*Extracto de Cimicifuga racemosa L.*

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto, o las indicadas por su médico o farmacéutico

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 30 días

**CONTENIDO DEL PROSPECTO:**

1. Qué es *Remifemin* y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar *Remifemin*.
3. Cómo tomar *Remifemin*
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de *Remifemin*
6. Contenido del envase e información adicional

**1. QUÉ ES REMIFEMIN Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Remifemin<sup>®</sup> es un medicamento a base de plantas para el alivio de los síntomas asociados a la menopausia.

Remifemin<sup>®</sup> está indicado en el tratamiento de síntomas relacionados con la menopausia tales como sofocos y sudoración intensa.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 30 días de tratamiento.

**2. QUE NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR REMIFEMIN**

***No tome Remifemin:***

Si usted tiene hipersensibilidad (alergia) al rizoma de *Cimicifuga racemosa* L. o a cualquier otro componente de Remifemin (ver sección 6. Información Adicional)

***Advertencias y precauciones:***

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar este medicamento:

- Si Usted ha tenido daño hepático. En ese caso, solo debe tomar Remifemin después de consultar a su médico.
- Si observa signos y síntomas que pudieran sugerir daño hepático (cansancio, pérdida de apetito, piel y ojos amarillos, dolor fuerte en la parte superior del estómago con náusea y vómitos, u orina oscura). En ese caso debe dejar inmediatamente el tratamiento y consultar a su médico
- Si aparece sangrado vaginal u otros síntomas debe consultar al médico
- Si ha sido tratado o está siendo tratado con estrógeno para el tratamiento de cáncer de pecho u otros tumores hormono dependientes. Debe consultar a su médico antes de iniciar el tratamiento con Remifemin
- Si los síntomas continúan o empeoran después de 8 semanas de tratamiento, se debe consultar al médico o farmacéutico

***Uso de Remifemin con otros medicamentos:***

No se han descrito interacciones.

Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando /utilizando, ha tomado/utilizado recientemente o podría tener que tomar/utilizar cualquier otro medicamento

***Embarazo y lactancia:***

Este medicamento no está indicado para mujeres embarazadas o durante la lactancia. La seguridad de este medicamento durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo